



สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ พลิน ชีวะอินทรีรีพ โทร 02-6786888



ระบบดันอ่อน



ใช้ปุ๋ยน้ำ 1 ลิตร ต่อน้ำ 1,000 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7 วัน (ฉีดพ่น 40 ลิตร/ไร่)

ฉีดพ่นเฉพาะทางใบ และรากอากาศ



ระบบบาร์งดัน



ใช้ปุ๋ยน้ำ 1 ลิตร ผสมกับน้ำส้มควันไม้
1 ลิตร ต่อน้ำ 500 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7 วัน (ฉีดพ่น 40 ลิตร/ไร่)

ต้นเจริญเติบโตสมบูรณ์ สม่ำเสมอ



ระบบก่อนการติดดอก



ใช้ปุ๋ยน้ำ(เร่งดอก) 1 ลิตร ผสมกับ
น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร ต่อน้ำ 500 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7 วัน (ฉีดพ่น 40 ลิตร/ไร่)

ใบมัน หนา ใบมีมอร์ดและแมลงรบกวน



ระบบป้องกัน



ใช้ปุ๋ยน้ำ(หวาน) 1 ลิตร ผสมกับน้ำส้มควันไม้
1 ลิตร ต่อน้ำ 500 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 5 วัน
(ฉีดพ่น 40 ลิตร/ไร่)

ช่วยป้องข้อดือกและขยายขนาด
ของดอก ยังคงเวลาการเก็บเกี่ยว



เทคนิคการควบคุมหอยทาง หอยเจดีย์ : ใช้ pH 12 โรยที่รากกล้วยไม้ สลับกับใช้น้ำส้มควันไม้ ฉีดทางใบ จะลดการระบาดของหอยในกล้วยไม้ได้



สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ พลิน ชีวะอินทรีย์ โทร 02-6786888



การปรับสภาพดิน ก่อนปลูกหญ้า

** ทำการรดน้ำก่อนการปรับสภาพดินทุกครั้ง



โดยแนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดิน ดังนี้

pH 6

ควรใช้ โดโลไมท์ 500 อย่างน้อย 50 กก./ไร่

pH 5-6

ควรใช้ pH 11+ อย่างน้อย 100 กก./ไร่

pH 4-5

ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 300 กก./ไร่

pH ต่ำกว่า 3

ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 1,500 กก./ไร่

ช่วงการดูแลรักษาทั่วไป



ใช้ pH 11 พลัส จำนวน 50 กก./ไร่ หัวน้ำให้ทั่ว และรดน้ำตาม



ใช้ปุ๋ยผง/เม็ด ถ้าค้างคาว 50 กก./ไร่ หัวน้ำทุกๆ 1 เดือน



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร ผสมกับปุ๋ยม่วง 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน บริเวณหน้ากรีนของสนามกอล์ฟ โดยสามารถใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่

การใช้ส่าน้ำมีเชื้อรากและแมลงรบกวน



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร ผสมกับปุ๋ยม่วง 1 ลิตร และน้ำส้มควันไม้(พรีเมี่ยมโกลด์) 0.5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน โดยสามารถใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่

ใช้แล้วต้นหญ้าเขียวนาน (เขียวนาน) ดินไม่แห้ง น้ำเชื้อรากลดลง





สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สนามฟุตบอล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ พลิน ชั่วอินทรีย์ โทร 02-6786888



การปรับสภาพดิน ก่อนปลูกหญ้า

**** ทำการรัดดินก่อนการปรับสภาพดินทุกครั้ง**



โดยแนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดิน ดังนี้

pH 6

ควรใช้ โดโลไมท์ 500 อย่างน้อย 50 กก./ไร่

pH 5-6

ควรใช้ pH 11+ อย่างน้อย 100 กก./ไร่

pH 4-5

ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 300 กก./ไร่

pH ต่ำกว่า 3

ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 1,500 กก./ไร่

แปลงเพาะหญ้า



ใช้หินกษาไฟ 1 ส่วน + pH 11 พลัส 1 ส่วน + ทราย 3 ส่วน

(หินกษาไฟ 0.5 ตัน + สารปรับสภาพดิน pH 11 พลัส 0.5 ตัน + ทราย 4 คิว ในในพื้นที่ 1 ไร่)

หัวนวนลงพื้นให้ทั่ว ก่อนปลูกหญ้า เพื่อปรับค่า pH รักษาความชื้นของดิน และป้องกันเชื้อร้ายต่างๆ จากนั้น หัวนวนปุ๋ยผงถ้าค้างคาว ทับหน้าบ้างๆ และทำการปลูกหญ้า



ช่วงการดูแลรักษาทั่วไป



ใช้หินกษาไฟ 1 ส่วน + pH 11 พลัส 1 ส่วน + ทราย 3 ส่วน


(หินกษาไฟ 0.5 ตัน + สารปรับสภาพดิน pH 11 พลัส 0.5 ตัน + ทราย 4 คิว ในในพื้นที่ 1 ไร่)

จากนั้นใช้ ปุ๋ยผงถ้าค้างคาว 100 กก./ไร่ หัวนวนโดยใช้เครื่องหัวนวน และช่วยให้การยึดเกาะของรากได้ดี



ใช้ปุ๋ยเขียว 2 ลิตร + ปุ๋ยม่วง 2 ลิตร + น้ำส้มควันไน 2 ลิตร ต่อน้ำ 350 ลิตร
(พื้นที่สูบ 1 ไร่)

ฉีดพ่น ให้ทั่วทั้งสนาม





สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีฯ โทร 02-6786888

**** ทำการวัดดินก่อนการปรับสภาพดินทุกครั้ง**

โดยแนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดิน ดังนี้

pH 6
ควรใช้ โดโลไมท์ 500 อย่างน้อย 50 กก./ไร่

pH 5-6
ควรใช้ pH 11+ อย่างน้อย 100 กก./ไร่

pH 4-5
ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 300 กก./ไร่

pH ต่ำกว่า 3
ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 1,500 กก./ไร่



ช่วงการเตรียมดิน



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. + pH 11 พลัส 50 กก. + ตินกเข้าไฟ 25 กก. ผสมกับปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มคันใน 1 ลิตร

คลุกให้ทั่วกัน รองกันหลุม ต้นละ 1 กำมือ

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางดิน



หลังย้ายปลูก 10 วัน



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดลงทางดินทุกๆ 1 เดือน



ใช้ปุ๋ยนวง 50 ซีซี และน้ำส้มคันใน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

(ฉีดพ่น 2 เม./ไร่)
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 5-7 วัน

ใบเขียวขัน ดันลงบุรณ์



หลังย้ายปลูก 35-40 วัน (เริ่มเห็นผลดอก)



ใช้ปุ๋ยเขียว(เริ่มดอก) 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดลงทางดินทุกๆ 1 เดือน



ใช้ปุ๋ยนวง(เริ่มดอก) 50 ซีซี และน้ำส้มคันใน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

(ฉีดพ่น 2 เม./ไร่)
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 3-5 วัน

ดอกมีขนาดใหญ่ขึ้น ขายได้ราคา





สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภคิน ชีวะอินทรีร์ โทร 02-6786888



**** ทำการวัดดินก่อนการปลูกสภาพดินทุกรั้ง**

โดยแนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดิน ดังนี้

pH 6
ควรใช้ โดโลไมท์ 500 อย่างน้อย 50 กก./ไร่

pH 5-6
ควรใช้ pH 11+ อย่างน้อย 100 กก./ไร่

pH 4-5
ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 300 กก./ไร่

pH ต่ำกว่า 3
ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 1,500 กก./ไร่


ขั้นตอนการเตรียมดิน



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. + pH 11 พลัส 25 กก. + หินกรูเข้าไฟ 25 กก. ผสมกับ ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มควนไน 1 ลิตร

คลุกให้ทั่วกัน รองกันหลุม ต้นละ 1 กก. มือ และหว่านทุกๆ 3 เดือน

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางเดิน



ระยะบำรุงดัน



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร
ผสมน้ำ 100 ลิตร
ฉีดพ่นหรือราดลงทางเดิน
ทุกๆ 1 เดือน



ใช้ปุ๋ยม่วง 50 ซีซี และน้ำส้มควนไน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
(ฉีดพ่น 2 เป้า/ไร่)
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 3-5 วัน

ในเขียวขัน ต้นสมบูรณ์



ระยะก่อนติดดอก-ติดดอก



ใช้ปุ๋ยเขียว(เร่งดอก)
1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร
ฉีดพ่นหรือราดลงทางเดิน
ทุกๆ 1 เดือน



ใช้ปุ๋ยม่วง(เร่งดอก) 50 ซีซี และน้ำส้มควนไน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
(ฉีดพ่น 2 เป้า/ไร่)
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 3-5 วัน

กระตุ้นการติดดอกของมะลิ
และทำให้ดอกร่วงน้อยลง

