

# หมวด : ไม้ผล

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. กล้วย           | 11. อินทน้ำลัม |
| 2. ทุเรียน         | 12. มะละกอ     |
| 3. ลำไย (ธรรมชาติ) | 13. แตงโม      |
| 4. ลำไย (น้ำหยด)   | 14. ส้ม        |
| 5. ลิ้นจี่         | 15. ส้มโอ      |
| 6. มะม่วงน้ำดอกไม้ | 16. แก้วมังกร  |
| 7. ลองกอง          | 17. เมล่อน     |
| 8. สับปะรด         | 18. ชมพู       |
| 9. สตrobotเบอรี่   | 19. มะพร้าว    |
| 10. องุ่น          |                |

## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภลิน จำกัด ชั่วโมงที่ โทร 02-6786888

**\*\* ทำการวัดดินก่อนการปรับสภาพดินทุกครั้ง**



โดยแนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดิน ดังนี้

**pH 6**

ควรใช้ โดโลไมท์ 500 อย่างน้อย 50 กก./ไร่

**pH 5-6**

ควรใช้ pH 11+ อย่างน้อย 100 กก./ไร่

**pH 4-5**

ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 300 กก./ไร่

**pH ต่ำกว่า 3**

### ช่วงการเตรียมดิน



### ช่วงบำรุงดัน



### ช่วงเริ่มออกผล



### ช่วงบำรุงผล



ใช้ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้าค้างคาว 100 กก. + pH 11 พลัส 25 กก. + หินภูเขาไฟ 25 กก. ผสมกับปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร  
คลุกให้ทั่วกันหวานในพื้นที่ 1 ไร่  
(โดยปรับน้ำค่า pH ดิน อยู่ในช่วง 6.0-6.5)

ใช้ปุ๋ยเขียว 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน  
และ ใช้ปุ๋ยม่วง 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้มควันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15-30 วัน  
(ฉีดพ่นทางดินและทางใบ 2 เป้า/ไร่)

ใช้ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้าค้างคาว 100 กก. + โดโลไมท์ 500 อัตรา 25 กก.  
คลุกให้ทั่วกันหวานดันละ 1-2 กก. หวานทุกๆ 4 เดือน

ใช้ปุ๋ยเขียว (หวาน) 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน  
ใช้ปุ๋ยม่วง(หวาน) 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้มควันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 10-15 วัน  
(ฉีดพ่นทางดินและทางใบ 2 เป้า/ไร่)

**เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางดิน**



การลดลงของต่อการใช้ปุ๋ย ทีพีไอ ลดการระดับสูง ดันสมบูรณ์



ปลูกลัวยมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์





## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภลิน จำกัดอินทร์ โทร 02-6786888



### ทางดิน

#### ช่วงนำร่องดันหลังเก็บเกี่ยว ( พฤษภาคม - พฤศจิกายน )



ใช้ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้าค้างคาว 100 กก. +  
pmH 11 พลัส 25 กก. + หินขากษาไฟฟ์  
25 กก. + ไดโอลไมท์ 500 อัตรา 50 กก.  
ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มครัวน้ำ 1 ลิตร  
  
คลุกให้ทั่วทั่ว หวานดันหลัง 3-5 กก.  
ภายในทรงๆ ทุกๆ 4 เดือน

#### ช่วงเร่งดอก ( ธันวาคม - มกราคม )



ใช้ปุ๋ยเขียว (เร่งดอก) 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ราดลงทางดิน หรือปุ่ยไปกับระบบน้ำ  
ทุกๆ 30 วัน ( 1 ลิตร / ไร่ )

#### ช่วงบำรุงผล ( กุมภาพันธ์ - เมษายน )



ใช้ปุ๋ยเขียว (หวาน) 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ราดลงทางดิน หรือปุ่ยไปกับระบบน้ำ  
ทุกๆ 30 วัน ( 1 ลิตร / ไร่ )

### ทางใบ



ใช้ปุ๋ยน้ำ 100 ซีซี ผสมน้ำส้มครัวใน 100 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางล่างต้นและใบ  
ทุกๆ 15 วัน (ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่)



ดันสมบูรณ์ ในในญี่ เขียวเข้ม โรคและแมลงไม่รบกวน



ดอกสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์การติดผลสูง



ใช้ปุ๋ยน้ำ (หวาน) 50 ซีซี ผสมน้ำส้มครัวใน 100 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางล่างต้นและใบ ทุกๆ 15 วัน  
(ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่)



ลูกใหญ่ มีน้ำหนัก



## สูตรการใช้ปุ๋ย օอแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชั่วขันทรีบี โทร 02-6786888

### ระบบหลังการเก็บเกี่ยว

#### ทางเดิน



ใช้ปุ๋ยเม็ด/ผง ถ้าค้างคา 100 กก. +  
โดโลไมท์ 500 อัตรา 50 กก.+  
ตินกุเข้าไฟ 25 กก. ผสมกับ  
ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำสัมควรน้ำ 1 ลิตร

คลุกให้ทั่วกันทั่วงาน ต้นละ 3-5 กก.  
ภาชนะทรงฟุ่ม จากนั้นใส่ทุกๆ 3 เดือน  
(โดยปรับค่า pH ดิน อยู่ในช่วง 6.0-6.5)

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางเดิน

### ระยะใบแก่-ติดดอก (1.5 - 2 เดือน)



ใช้ปุ๋ยเม็ด(เร่งดอก) 50 ซีซี ผสมกับน้ำสัม  
ควรน้ำ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ 2-3 ครั้ง  
เริ่มเท็นดาวดอก ถึงก่อนดอกบาน  
(ฉีดพ่น 3 เป็น / ครั้ง)

เร่งการออกดอก ช่วยการเบิดช่อดอก  
เพิ่มการติดผล



### ระยะผลอ่อน-ผลเข้าเม็ดดำ (5 เดือน)



ใช้ปุ๋ยเม็ด(หวาน) 50 ซีซี ผสมกับน้ำสัม  
ควรน้ำ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน  
(ฉีดพ่น 3 เป็น / ครั้ง)

บำรุงราก บำรุงผลให้สมบูรณ์  
ผลโต สม่ำเสมอ



#### ทางใบ



ใช้ปุ๋ยเม็ด 50 ซีซี ผสมกับน้ำสัมควรน้ำ 100 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ  
ทุกๆ 15 วัน (ฉีดพ่น 3 เป็น / ครั้ง)



## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี โทร 02-6786888

### ระบบหลังการเก็บเกี่ยว (4 - 5 เดือน)

#### ทางเดิน



ใช้ปุ๋ยเม็ด/ผง ถ้าค้างคาว 100 กก. +  
โดโลไมท์ 500 อัตรา 50 กก.+  
หินภูเขาไฟ 25 กก. ผสมกับ  
ปุ๋ยเชื้อ 5 ลิตร และน้ำส้มควนน้ำ 1 ลิตร

คลุกให้ทั่วทั้งพื้นที่ ดันลง 3-5 กก.  
ภาชนะทรงพุ่ม จากนั้นใส่หาก 3 เดือน  
(โดยปรับน้ำค่า pH ดิน อยู่ในช่วง 6.0-6.5)

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางเดิน

#### ทางใน



ใช้ปุ๋ยม่วง (หวาน) 50 ซีซี/平米 ผสมกับ<sup>\*</sup>  
น้ำส้มควนน้ำ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน  
(ฉีดพ่น 3 เป๊ป/ไร่)

### ระยะในแก่-ออกดอก (1.5 - 2 เดือน)



ใช้ปุ๋ยเชื้อ 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ปล่อยตามระบบน้ำ ทุกๆ 30 วัน (1 ลิตร/ไร่)  
และใช้ปุ๋ยม่วง (เรցดอก) 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้ม  
ควนน้ำ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ  
2-3 ครั้ง (ฉีดพ่น 3 เป๊ป/ไร่)  
เริ่มเห็นตัดอก ถึงก่อนดอกบาน

### เร่งการออกดอก ช่วยการยึดช่อดอก เพิ่มการติดผล




### ระยะผลอ่อน-ผลเข้าเม็ดดำ (5 เดือน)



ใช้ปุ๋ยเชื้อ 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ปล่อยตามระบบน้ำ ทุกๆ 30 วัน (1 ลิตร/ไร่)  
และใช้ปุ๋ยม่วง (หวาน) 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้ม  
ควนน้ำ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ  
ทุก 15 วัน (ฉีดพ่น 3 เป๊ป/ไร่)

### บำรุงชัวผล บำรุงผลให้สมบูรณ์ ผลโต สม่ำเสมอ





## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภพัน ชั่วอินทรีฯ โทร 02-6786888



### ระบบหลังการเก็บเกี่ยว

#### ทางดิน



ใช้ปุ๋ยเม็ด/ผง ก้าวค้างคาว 100 กก. +  
โดโลไมท์ 500 ลิตร/50 กก.+  
หินภูเขาไฟ 25 กก. ผสมกับ  
ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร  
  
คลุกให้ทั่วทั้งหัวราก ต้นละ 3-5 กก.  
นำไปท่องทุ่ม จากนั้นใส่ทุกๆ 3 เดือน  
(โดยปรับน้ำค่า pH ดิน อยู่ในช่วง 6.0-6.5)

### ระบบใบแกะ-ติดดอก



ใช้ปุ๋ยเมฆ(เร่งดอก) 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ 2-3 ครั้ง  
เริ่มเท็นดาวอุก ถึงก่อนดอกบาน  
(ฉีดพ่น 3 เป๊ะ / ไร่)

เร่งการออกดอก ขยายการยืดช่อออก  
เพิ่มการผลิตผล



### ระบบผลอ่อน-ผลเข้าเม็ดดำ



ใช้ปุ๋ยเมฆ(หวาน) 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน  
(ฉีดพ่น 3 เป๊ะ / ไร่)

สร้างเนื้อ เร่งความหวาน  
รสชาติดี ผิวสวย



#### ทางใบ



ใช้ปุ๋ยเมฆ 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ  
(ฉีดพ่น 3 เป๊ะ / ไร่)



## สูตรการใช้ปุ๋ย օอแกนิค ทีพีไอ



### มะม่วงน้ำดอกไม้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลิน ชั่วะอินทรี โทร 02-6786888



#### ระยะเตรียมดิน ก่อนการсадสารดึงช่อดอก



ใช้ปุ๋ยเม็ด/ผง ถ้าค้างคาว 100 กก. +  
โดโลไนท์ 500 วัตตรา 50 กก.+  
หินภูเขาไฟ 25 กก. ผสมกับ<sup>ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มคันใน 1 ลิตร</sup>

คลุกให้ทั่วคันหว่าน ต้นละ 3-5 กก.  
ภายในทรงพุ่ม จากนั้นใส่ทุกๆ 3 เดือน  
(โดยปรับค่า pH ดิน อยู่ในช่วง 6.0-6.5)

ตัดแต่งทรงพุ่ม รากการมารุณปุ๋ยและสาร  
เร่งการออกดอกนกกดดู




#### ระยะบำรุงดัน เพื่อให้พืชอ่อนต่อการсадสาร ดึงช่อดอก



ใช้ปุ๋ยม่วง 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้มคันใน  
100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน  
(ฉีดพ่น 3 เป๊/ไร่ )

การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย ทีพีไอ  
เมื่อสัมผัสใน ใบจะเนียนฯ ไม่ร่วงหล่น



#### ระยะใบแก่-ช่วงก่อนการดึงดอก



ใช้ปุ๋ยม่วง (เร่งดอก) 50 ซีซี ผสมกับ<sup>น้ำส้มคันใน 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</sup>  
(ฉีดพ่น 3 เป๊/ไร่)  
ฉีดพ่นทางใบ รอบทรงพุ่ม ทุกๆ 15 วัน  
จนถึงระยะก่อนดอกนาน

การดึงดอกตี ผ้าใบเป็นมัน  
ใบสีเขียวสม่ำเสมอ พรวดมิดแหลก



#### ระยะบำรุงผล



ปุ๋ยม่วง (หวาน) 50 ซีซี ผสมกับ<sup>น้ำส้มคันใน 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</sup>  
(ฉีดพ่น 3 เป๊/ไร่)  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน  
ดังเดรรอนดีผลจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยว

สร้างเนื้อ เร่งความหวาน  
รสชาติดี ผ้าสาย





## สูตรการใช้ปุ๋ย օอแกนิค ทีพีไอ



### ลองกอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลิน ชั้วอินทรีย์ โทร 02-6786888

#### ช่วงบำรุงต้น หลังการตัดแต่งกิ่ง



ใช้ปุ๋ยเม็ด ถ้าค้างคาว 100 กก. +  
โดโลไมท์ 500 อัตรา 50 กก.+  
หินกรุเข้าไฟ 25 กก. ผสมกับ  
ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มควนไม้ 1 ลิตร

คลุกให้ทั่วทั้งพื้นที่ ต้นละ 3-5 กก.  
ภายในทรงทุ่ม จากนั้นใส่หุกๆ 3 เดือน  
(โดยปรับค่า pH ดิน อยู่ในช่วง 6.0-6.5)

การใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาวและปุ๋ยเขียว  
จะทำให้เกิดรากฟอยอ่อนขึ้นมา  
กินปุ๋ยบนหน้าผาได้



ใช้ปุ๋ยเม็ด 50 ชีชี  
ผสมกับ น้ำส้มควนไม้ 100 ชีชี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น  
ทุก 10 - 15 วัน  
(ฉีดพ่น 2 เป็ / ไร่)

#### ฉีดพ่นทางลำต้นและใบ



#### ช่วงเร่งดอก กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป



ใช้ปุ๋ยเม็ด (เร่งดอก) 50 ชีชี ผสมกับ<sup>\*</sup>  
น้ำส้มควนไม้ 100 ชีชี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางลำต้นและใบทุกๆ 15 วัน  
จนกว่าดอกเริ่มออก แล้วจึงหยุดฉีด  
(ฉีดพ่น 2 เป็ / ไร่)

#### ฉีดพ่นทางลำต้นและใบ



#### ช่วงบำรุงผล



ใช้ปุ๋ยเม็ด (หวาน) 50 ชีชี ผสมกับ<sup>\*</sup>  
น้ำส้มควนไม้ 100 ชีชี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางลำต้นและใบ ทุกๆ 10 วัน  
(ฉีดพ่น 2 เป็ / ไร่)

#### ฉีดพ่นทางลำต้นและใบ





## สูตรการใช้ ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



\*\* ทำการวัดดินก่อนการปรับสภาพดินทุกครั้ง



โดยแนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดิน ดังนี้

**pH 6**  
ควรใช้ โดโลไมท์ 500 อย่างน้อย 50 กก./ไร่

**pH 5-6**  
ควรใช้ pH 11+ อย่างน้อย 100 กก./ไร่

**pH 4-5**  
ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 300 กก./ไร่

**pH ต่ำกว่า 3**  
ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 1,500 กก./ไร่



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. + โดโลไมท์ 500 อัตรา 50 กก. + หินภูเขาไฟ 25 กก. ผสมกับปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้ม ครัวน้ำ 1 ลิตร

คลุกให้ทั่วกันหวานในพื้นที่ 1 ไร่ หรือแคปคลุก

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางดิน



### ช่วงขยายสะโพก



ฉีดพ่นทางใบและลำต้น



ใช้ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้าค้างคาว 100 กก. ผสมกับปุ๋ยเขียว 10 ลิตร คลุกให้เข้ากัน หวานลงทางดิน ได้ในพื้นที่ 1 ไร่ หวานทุกๆ 2 เดือน

ใช้ปุ๋ยทางดินเพื่อเร่งขยายสะโพก



### ช่วงก่อนบุบดอก 15 วัน



ฉีดพ่นทางใบและลำต้นเพื่อเร่งดอก



ใช้ปุ๋ยเขียว 10 ลิตร/ไร่ ฉีดพ่นทางดินและโคนต้น

ฉีดพ่นบริเวณโคนต้น



### ช่วงขยายลอก




ใช้ปุ๋ยม่วง (หวาน) 2 ลิตร/ไร่



ใช้ปุ๋ยเขียว 10 ลิตร/ไร่ ฉีดพ่นทางดินและโคนต้น

ฉีดพ่นบริเวณโคนต้น



ผลใหญ่  
น้ำหนักดี

## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภคิน ชั่วะอินทรีย์ โทร 02-6786888

**\*\* ทำการวัดดินก่อนการป้อนสภาพดินทุกครั้ง**



โดยแนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดิน ดังนี้

**pH 6**  
ควรใช้ โดโลไมท์ 500 อย่างน้อย 50 กก./ไร่

**pH 5-6**  
ควรใช้ pH 11+ อย่างน้อย 100 กก./ไร่

**pH 4-5**  
ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 300 กก./ไร่

**pH ต่ำกว่า 3**  
ควรใช้ pH 12 อย่างน้อย 1,500 กก./ไร่

### ขั้นตอนการเตรียมดิน



ใช้ปุ๋ยผงค้าค้างคาว 100 กก. + โดโลไมท์ 500 สัครา 50 กก. + ตินก夷化ไฟ 25 กก. ผสมกับปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้ม คั่วน้ำ 1 ลิตร

คอกให้ทั่วเก็บหัว่านในพื้นที่ 1 ไร่ และหัว่านลงดิน ทุกๆ 2 เดือน ทั้งนี้ควรสลับใช้ โดโลไมท์ 500

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางดิน

### ระบบบำรุงดิน



ใช้ปุ๋ยเขียว 50 ซีซี ผสมกับปุ๋ยม่วง 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบและลงดิน ทุกๆ 7-10 วัน (ฉีดพ่น 2 เป๊/ไร่)

การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย ทีพีไอ ในเขียวขี้น มันขี้น ดันสมบูรณ์

### ระบบก่อนติดดอก



ใช้ปุ๋ยเขียว(เรงตอก) 50 ซีซี ผสมกับปุ๋ยม่วง(เรงตอก) 50 ซีซี และน้ำส้ม คั่วน้ำ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบและลงดิน ทุกๆ 7-10 วัน (ฉีดพ่น 2 เป๊/ไร่)



กระตุ้นการติดดอกของสตอเบอร์รี่

### ระบบบำรุงผล-เก็บเกี่ยว



ใช้ปุ๋ยเขียว(หวาน) 50 ซีซี ผสมกับปุ๋ยม่วง(หวาน) 50 ซีซี และน้ำส้ม คั่วน้ำ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบและลงดิน ทุกๆ 7-10 วัน (ฉีดพ่น 2 เป๊/ไร่)

สร้างเนื้อ เร่งความหวาน รสชาติดี ผิวสวย ยืดอายุดันได้นานขึ้น



## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



องุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลิส จำกัด ชั่วโมงทำการ โทร 02-6786888



### ระยะพักดัน



ใช้น้ำปุ๋ยเม็ดถ้า/ พงค่างค่า 100 กก. +  
pmH 11 พลัส 25 กก. + โคลามิ่ม 500  
อัตรา 25 กก. + หินกรวดขาว 25 กก.  
ผสมกับ<sup>+</sup>  
ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และปุ๋ยส้มคั่วไม้ 1 ลิตร  
คลุกให้ทั่วกันหน่วง ตันละ 1-2 กก.  
และหน่วงทุกๆ 2 เดือน

ปรับสภาพดิน และตันเจริญเตบโตได้ดี



### ระยะหลังพุ่นดันเสร็จ



ใช้ปุ๋ยเขียว 200 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงดิน ทุกๆ 15 วัน  
( ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่ )

และใช้ปุ๋ยม่วง 100 ซีซี ผสมน้ำส้ม  
คั่วไม้ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน  
( ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่ )  
ฉีดพ่นทางใบ 2 ครั้ง

หลังจากพุ่นดันเสร็จ จะใช้ปุ๋ยม่วง  
ในอัตราส่วนที่เข้มข้นเพื่อกระตุนการแตก朵  
ของดันองุ่น



### ระยะเริ่มแตกใบ-เริ่มติดดอก



ใช้ปุ๋ยเขียว (รุ่งดอก) 200 ซีซี  
ผสมน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงดิน ทุกๆ 15 วัน  
( ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่ )

และใช้ปุ๋ยม่วง (รุ่งดอก) 50 ซีซี  
ผสมน้ำส้มคั่วไม้ 100 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ  
ทุกๆ 15 วัน ( ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่ )  
ฉีดพ่นทางใบ 2 ครั้ง

กระตุ้นการติดดอกขององุ่น



### ระยะผลเริ่มเข้าสี-เก็บผลผลิต



ใช้ปุ๋ยเขียว (หวาน) 200 ซีซี  
ผสมน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงดิน ทุกๆ 15 วัน  
( ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่ )

และใช้ปุ๋ยม่วง (หวาน) 50 ซีซี  
ผสมน้ำส้มคั่วไม้ 100 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ  
ทุกๆ 7 วัน ( ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่ )

ขนาดผลใหญ่ขึ้น หวาน  
รสชาติดี ผิวสวย มีวิตามินและสารอาหารมาก





การเตรียมน้ำมูลปลูก/  
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. +  
pH 11 พลัส 25 กก. + โภโลไมท์ 500  
อัตรา 25 กก. + หินภูเขาไฟ 25 กก.  
ผสมกับ<sup>บ</sup>  
บุบเพี้ยง 5 ลิตร และนาสัมควร์ไน 1 ลิตร  
รองกันหนอนหรือหัววนบริเวณทางทุ่ม  
ต้นละ 3-5 กก. ทุกๆ 3 เดือน

เพื่อให้ปุ๋ยเพี้ยง ทำปฏิกิริยาทางดิน<sup>บ</sup>  
และช่วยเร่งที่ปลดปล่อยธาตุอาหารรองใน<sup>บ</sup>  
สารปรับสภาพดิน pH 11 พลัส



สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิก ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ เพลิน ชีวะอินทรีย์ โทร 02-6786888


ช่วงหลังปลูก - แตกยอดใหม่

ทางดิน



ใช้ปุ๋ยเพี้ยง 1 ลิตร ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 500 ซีซี ต่อน้ำ 25 ลิตร  
ฉีดพ่นลงดิน เกลี่ยผืดละ 1 ลิตร  
ทุกๆ 30 วัน (ใช้ได้ในพื้นที่ 1 ไร่)

ช่วงก่อนติดเชื้อ



ทางดิน



ใช้ปุ๋ยเพี้ยง 1 ลิตร ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 500 ซีซี ต่อน้ำ 25 ลิตร  
ฉีดพ่นลงดิน เกลี่ยผืดละ 1 ลิตร  
ทุกๆ 30 วัน (ใช้ได้ในพื้นที่ 1 ไร่)

ช่วงการติดผล



ทางดิน



ใช้ปุ๋ยเพี้ยง 1 ลิตร ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 500 ซีซี ต่อน้ำ 25 ลิตร  
ฉีดพ่นลงดิน เกลี่ยผืดละ 1 ลิตร  
ทุกๆ 30 วัน (ใช้ได้ในพื้นที่ 1 ไร่)

ทางใบ



ใช้ปุ๋ยเพี้ยง 2 ลิตร ผสมกับ<sup>บ</sup>  
บุยม่วง 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร  
ฉีดพ่นทุกๆ 1 เดือน

ทางใบ



ใช้ปุ๋ยเพี้ยง 2 ลิตร ผสมกับ<sup>บ</sup>  
บุยม่วง(เร่งดอก) 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร  
ฉีดพ่นทุกๆ 1 เดือน

ทางใบ



ใช้ปุ๋ยเพี้ยง 2 ลิตร ผสมกับ<sup>บ</sup>  
บุยม่วง(หวาน) 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร  
ฉีดพ่นทุกๆ 1 เดือน

เพื่อให้ได้ดัชนีเจริญเติบโต เตรียมพร้อม<sup>บ</sup>  
ต่อการติดดอกและผล

บำรุงข้าวผล บำรุงผลให้สมบูรณ์<sup>บ</sup>  
ผลโต สม่ำเสมอ





## สูตรการใช้ปุ๋ย օอแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภเเลน ชั่วะอินทรีย์ โทร 02-6786888



### ช่วงการเตรียมดิน



ใช้ปุ๋ยเม็ดก้าวค้างคา 100 กก. +  
pH 11 พลัส 25 กก. + โอดโลไมท์ 500  
อัตรา 25 กก. + หินภูเขาไฟ 25 กก.  
ผสมกับ<sup>ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร</sup>  
รองกันหลุมหรือหัว่นบาริเคนแห้งฟุ่ม  
ต้นละ 2-3 กก.

ส่วนใหญ่ใช้ระยะปลูกที่ 3\*3  
จะได้ 170 ต้น/ไร่



### ช่วงบำรุงดัน



ใช้ปุ๋ยเขียว 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นลงดิน  
และ ใช้ปุ๋ยม่วง 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15-30 วัน  
( ฉีดพ่นทางดินและทางใบ 2 เป๊/ไร่ )

การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย օอแกนิค ทีพีไอ  
อัตราการรอดสูง ต้นสมบูรณ์



### ช่วงการติดดอก-เริ่มติดผล



ใช้ ปุ๋ยเม็ดก้าวค้างคา  
100 กก.  
ระหว่างต้นละ 2-3 กก.

ตอบสนองมะละกอบ่มความสมบูรณ์



### ช่วงบำรุงผล



ใช้ปุ๋ยเขียว (หวาน) 100 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน  
ใช้ปุ๋ยม่วง(หวาน) 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15-30 วัน  
( ฉีดพ่นทางดินและทางใบ 2 เป๊/ไร่ )

ผลมะละกอบ่มขนาดใหญ่ ลูกกด





## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีฯ โทร 02-6786888



### ช่วงการเตรียมดิน



ใช้ปุ๋ยผง ก้าคัตค้า 100 กก. ผสมกับ pH 11 พลัส 25 กก. + โคลามิ่น 500 อัตรา 25 กก. + หินกษาไฟ 25 กก.  
ผสมกับ ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้ม  
ควันไม้ 1 ลิตร

คุกให้ทั่ว กัน หวานรองกันหลุม  
หลุมละ 1-2 ก้ามือ  
(ควรปรับสภาพดินให้อุ่นช่วง pH 6.0-6.5)

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางดิน



ช่วงอายุ 10 วัน  
หลังย้ายปลูก



ใช้ปุ๋ยม่วง 50 ซีซี ผสมกับน้ำส้ม  
ควันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นลงทางใบ ทุก 7 วัน  
(ฉีดพ่น 2 เม./ไร่)

ฉีดพ่นทางใบ

ช่วงอายุ 25 วัน  
หลังย้ายปลูก



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร ผสมกับ  
น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร  
ต่อน้ำ 200 ลิตร  
(ฉีดพ่นตามระบบน้ำหรือ  
ฉีดพ่นลงดิน ในพื้นที่ 1 ไร่)


ฉีดพ่นทางดิน

ช่วงอายุ 40 วัน ขึ้นไป



ใช้ปุ๋ยม่วง(หวาน) 50 ซีซี ผสมกับ  
น้ำส้มควันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบทุก 7 วัน  
(ฉีดพ่น 2 เม./ไร่)

ฉีดพ่นทางใบ





## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิก ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภคิน จำกัด โทร 02-6786888

### ช่วงการเตรียมดิน/ ปูร์ณาดันหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต



ใช้ปุ๋ยเม็ดถั่วค้างคาว 100 กก. +  
pH 11 พลั๊ส 25 กก. + โดโลไมท์ 500  
อัตรา 25 กก. หินกุษาไฟ 25 กก.  
ผสมกับ

ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มคั่วันไม้ 1 ลิตร

คลุกให้ทั่ว กัน รองกันหลุม ดันละ 2 กก.  
และหัววนบริเวณแหงพุ่ม ดันละ 2-3 กก.  
ทุกๆ 4 เดือน

เพื่อป้องกันเขื้อโรคทางเดิน



### ระยะบำรุงดัน



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร  
ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางเดิน  
ทุกๆ 1 เดือน



ใช้ปุ๋ยม่วง 50 ซีซี และน้ำส้ม  
คั่วันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
( ฉีดพ่น 3 เป็ร/ไร่ )  
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน

ในเชิงขั้น ดันสมบูรณ์



### ระยะก่อนติดดอก



ใช้ปุ๋ยเขียว(เร่งดอก)  
1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางเดิน  
ทุกๆ 1 เดือน



ใช้ปุ๋ยม่วง(เร่งดอก) 50 ซีซี และ  
น้ำส้มคั่วันไม้ 50 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร  
( ฉีดพ่น 3 เป็ร/ไร่ )  
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน

กระตุ้นการติดดอกของส้ม  
ทำให้ดอกร่วงน้อยลง



### ระยะบำรุงผล-เก็บเกี่ยว



ใช้ปุ๋ยเขียว(หวาน) 1 ลิตร  
ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางเดิน  
ทุกๆ 1 เดือน



ใช้ปุ๋ยม่วง(หวาน) 50 ซีซี  
และน้ำส้มคั่วันไม้ 50 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร  
( ฉีดพ่น 3 เป็ร/ไร่ )  
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7 วัน

ช่วยขยายขนาดของผลส้ม  
ลูกโต ผลดก คุณภาพดี





## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิก ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภคิน จำกัด ชั่วอันทรี โทร 02-6786888

### ขั้นการเตรียมดิน/ บำรุงดันหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. +  
pH 11 พลัส 25 กก. + โดโลไมท์ 500  
อัตรา 25 กก. + ตินกษาไฟ 25 กก. ผสมกับ<sup>ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร</sup>  
<sup>และน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร</sup>

คลุกให้ทั่ว กัน รองกันหลุม ดันละ 2 กก.  
และหัววนทุกๆ 3 เดือน บริเวณทรงพุ่ม<sup>ดันละ 2-3 กก.</sup>

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางดิน



### ระยะบำรุงดัน



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร  
ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางดิน<sup>ทุกๆ 1 เดือน</sup>



ใช้ปุ๋ยเขียว 50 ซีซี และน้ำส้ม<sup>ควันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</sup>  
(ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่)  
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน

ในเขียวชัน ดันลมบุรุษ



### ระยะก่อนติดดอก



ใช้ปุ๋ยเขียว(เร่งดอก) 1 ลิตร  
ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางดิน<sup>ทุกๆ 1 เดือน</sup>



ใช้ปุ๋ยเขียว(เร่งดอก) 50 ซีซี และ<sup>น้ำส้มควันไม้ 50 ซีซี</sup>  
<sup>ต่อน้ำ 20 ลิตร</sup>  
(ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่)  
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน

กระดันการติดต่อของส้มโอ  
ทำให้ต่อกร่างน้อยลง



### ระยะบำรุงผล-เก็บเกี่ยว



ใช้ปุ๋ยเขียว(หวาน) 1 ลิตร  
ผสมน้ำ 100 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางดิน<sup>ทุกๆ 1 เดือน</sup>



ใช้ปุ๋ยเขียว(หวาน) 50 ซีซี  
และน้ำส้มควันไม้ 50 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร  
(ฉีดพ่น 3 เป้า/ไร่)  
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7 วัน

ช่วยขยายขนาดของผลส้มโอ  
ลูกโต ผลดก คุณภาพดี



## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภพนิยม ชีวะอินทรีฯ โทร 02-6786888



### ช่วงการเตรียมดิน



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. +  
pH 11 พลัส 25 กก. + โดโลไมท์ 500  
อัดร้า 25 กก. + หินคุกเข้าไฟ 25 กก.

ผสมกับ ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร  
และน้ำส้มคั่นไม้ 1 ลิตร  
  
คลุกให้ทั่วทั่ว หวานรองกันหลุม  
หลุมละ 2-3 กก. ( 1 หลุม ปลูก 4-5 ต้น )

เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางดิน



### ช่วงบำรุงดัน



ใช้ปุ๋ยเขียว 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นลงดิน

และ ใช้ปุ๋ยม่วง 50 ซีซี ผสมกับ  
น้ำส้มคั่นไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15-30 วัน  
(ฉีดพ่นทางดินและทางใบ 2 เป๊/ไร่)

การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย ทีพีไอ  
อัตราการรอดสูง ต้นสมบูรณ์



### ช่วงเริ่มติดผล



ใช้ ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก.  
หวานค้างปลูก ค้างละ 2 กก.  
หวานทุกๆ 4 เดือน

ดอกมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์



### ช่วงบำรุงผล



ใช้ปุ๋ยเขียว (หวาน) 100 ซีซี  
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน

ใช้ปุ๋ยม่วง(หวาน) 50 ซีซี ผสมกับ  
น้ำส้มคั่นไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15-30 วัน  
(ฉีดพ่นทางดินและทางใบ 2 เป๊/ไร่)

ผลแก้วมังกร ขนาดใหญ่ มีน้ำหนัก





## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ




สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลิน จำกัด ชั่วโมงทำการ โทร 02-6786888

### ช่วงการเตรียมวัสดุปลูก



ใช้ปุ๋ยผงถ้าค้างคาว จำนวน 200-300 กก.  
ผสมกับ ชัยมะพร้าว ที่ผ่านการกรอง เชือ  
จำนวน 3 ดัน คลอกให้แห้ง  
แล้วนำมาใส่ลงบนแปลงปลูกเมล่อน

นำวัสดุปลูกที่เตรียมไว้ มาเกลี่ยลงบนแปลง  
ขนาด กว้าง 40 \* ยาว 40 \* สูง 20 ซึ่งปลูกล้อมเป็น  
ฟันปลา วางระบบน้ำ 3 เส้น



### ช่วงอายุ 10 วัน หลังย้ายปลูก



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร  
ต่อน้ำ 500 ลิตร  
(ให้ตามระบบน้ำทุกวัน)



### ช่วงอายุ 30 วัน หลังย้ายปลูก



\* ค่า EC ต้องอยู่ที่ 1.8 - 2


### ช่วงอายุ 40 วัน ขึ้นไป



ใช้ปุ๋ยเขียว(หวาน) 50 ซีซี ผสมกับ  
น้ำส้มควันไม้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่นทางใบทุก 5-7 วัน  
(ฉีดพ่น 2 เป้า/ไร่)



#### ฉีดพ่นทางใบ



#### ฉีดพ่นทางเดิน





## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ พลีน ชัวร์อินทรีฯ โทร 02-6786888

### ช่วงการเตรียมดิน/ ช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต



**ใช้ปุ๋ยเม็ดถั่วค้างคาว 100 กก. +  
pH 11 พลัส 25 กก. + โดโลไมท์ 500  
อัตรา 25 กก. + บินกุข้าไฟ 25 กก.  
ผสมกับ ปุ๋ยซียา 5 ลิตร และน้ำส้ม  
ควนไม้ 1 ลิตร**

คลุกให้ทั่วกัน รองกันหลุม ต้นละ 2 กก.  
และหัววนบิเรลเทรอหุ่ม 3-4 กก.  
ทุกๆ 3 เดือน

เพื่อป้องกันเขื้อโรคทางดิน



### ระยะบำรุงดัน



ใช้ปุ๋ยซียา 5 ลิตร  
ผสมน้ำ 200 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางดิน  
ทุกๆ 10 - 15 วัน



### ระยะก่อนติดดอก-ติดดอก



ใช้ปุ๋ยซียา(เร่งดอก)  
5 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางดิน  
ทุกๆ 1 เดือน



### ระยะติดผล



ใช้ปุ๋ยซียา(หวาน)  
5 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร  
ฉีดพ่นหรือราดลงทางดิน  
ทุกๆ 1 เดือน

ในซียาขัน ดันสมบูรณ์



กระดันการติดดอกของชุมพร  
และทำให้ติดกรวยน้อยลง



ใช้ปุ๋ยนวง(หวาน) 200 ซีซี และน้ำส้ม  
ควนไม้ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

( ฉีดพ่น 2 เป๊/ไร่ )  
ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 3-5 วัน

ขยายขยายขนาดของผลชุมพร  
ป้องกันแมลงรบกวน





## สูตรการใช้ปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีพีไอ โภพิน ชั่วะอินทรีฯ โทร 02-6786888



### การเตรียมหลุมปลูก



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. +  
pH 11 พลัส 25 กก. + โดโลไมท์ 500  
อัตรา 25 กก. + หินกุษาไฟ 25 กก.  
ผสมกับ  
ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และป่าลันควนไม้ 1 ลิตร  
คลุกให้ทั่วกัน

รองกันหลุมปลูก หลุมละ 1-2 กก.



### มะพร้าว อายุ 1-5 ปี



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. +  
pH 11 พลัส 25 กก. + โดโลไมท์ 500  
อัตรา 25 กก. + หินกุษาไฟ 25 กก.  
ผสมกับ  
ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และป่าลันควนไม้ 1 ลิตร  
คลุกให้ทั่วกัน

หัวรากต้นละ 2 กก. ทุกๆ 4 เดือน



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร ผสมกับ  
ปุ๋ยม่วง 0.5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร  
ฉีดพ่นทุกๆ 1 เดือน

### มะพร้าว อายุ 5 ปี ขึ้นไป



ใช้ปุ๋ยเม็ดถ้าค้างคาว 100 กก. +  
pH 11 พลัส 25 กก. + โดโลไมท์ 500  
อัตรา 25 กก. + หินกุษาไฟ 25 กก.  
ผสมกับ  
ปุ๋ยเขียว 5 ลิตร และน้ำส้มควนไม้ 1 ลิตร  
คลุกให้ทั่วกัน

หัวรากต้นละ 2 กก. ทุกๆ 4 เดือน



ใช้ปุ๋ยเขียว 1 ลิตร ผสมกับ  
ปุ๋ยม่วง 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร  
ฉีดพ่นทุกๆ 1 เดือน

### การฉีดพ่นทางใบ(ใช้สูตรธรรมชาติลับกับสครหวาน)

