


## โรคราษฎร์ ปัญหาใหญ่ของชาวเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา ลักษณะอาการของโรค เปลือกยางพาราจะร่อน  
จนเป็นแกนเนื้อไม้ จนทำระบบท่อน้ำยางขาด



ผลผลิตบริบูรณ์น้ำยางลด  
น้อยลง นำยางที่ได้ส่วนใหญ่  
เป็นน้ำเลี้ยง จึงเป็นเหตุให้  
ปลูกเชื้อน้ำยางต่ำ

### หยุด การเลือกใช้ปุ๋นแดงทา

หน้ายาง ซึ่งยังเป็นการแก้ปัญหา  
ระยะสั้น ซึ่งการแก้ด้วยวิธีนี้ เป็น  
สาเหตุของยางหน้าตายนึงตามมา

เพาะเนื่องจากใช้

ปุ๋นแดงทาหน้ากาวดูดต้อง

หน้ากาวจะแห้งเป็นผล

ทำให้ ราเส้นดำหยุดการ


แพร่ระบาดทันที แต่แค่

ชั่วคราว



- ผลจากการใช้ปุ๋นแดง หรือดินทากหน้ายางพาราส่วนใหญ่  
มักจะมีการผสมสารเมฆาแล็กซิน ซึ่งทำให้เกิดการตายของ  
เซลล์บริเวณนั้น

ผลจากการใช้เคมีสารเร่ง หรือ ผลจากการ  
ใช้ปุ๋นแดง



แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตชาวสวนยางก็เปลี่ยน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยม่วง ทีพีไอ ทำหน้ากรีด หรือ นีดพ่น ให้รอบลำต้นยางพารา ยับยั้งการเกิดราสีน้ำเงิน และป้องกันปัญหาหน้ายางตายนิ่ง



ใช้ปุ๋ยม่วง 5 ข้อน้ำ ต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออัตราไม่เกิน 1:400 สำหรับยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีดจนถึงอายุไม่เกิน 15 ปี

หลังการใช้ปุ๋ยม่วง มีผลทำให้เปลือกนิ่มและน้ำยางจะไหลออกเดjmaga เป็นน้ำยางดิบ มีความเข้มข้น ของเปอร์เซ็นต้น้ำยางสูง ห้ามใช้เกิน อัตราที่แนะนำ เพราะอาจทำให้หน้ากรีดนิ่มนิ่นจนเน่าได้ เนื่องจากเปลือกผิวลำต้นยางยังอ่อน

ใช้ปุ๋ยม่วง 10 ข้อน้ำ ต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออัตราไม่เกิน 1:200 สำหรับยางพารา ที่อายุ 15 ปีขึ้น ใช้วิธีฉีดพ่น หรือใช้แบลงกาลี ทำหน้ากรีด ยางหน้ากรีดปกติใช้ปุ๋ยม่วงทุก 20—30 วัน กรณียางตายนิ่งให้ใช้น้ำส้มควันไม้ 10 ข้อน้ำ ต่อน้ำ 20 ลิตรผสมร่วมกับ กับปุ๋ยม่วงไปด้วย ยางที่มีปัญหาเปลือกแห้งหรือหน้ายางตายนิ่งให้ใช้ทุก 10 วัน ประมาณ 5 เดือน ก็จะกลับมาเปิดกรีดได้เป็นปกติ

ผลจากการใช้ปุ๋ยม่วง ทีพีไอ กรีดนิ่ม น้ำยางเพิ่ม เปอร์เซ็นต์

หน้ากรีดไม่มีแผงเส้นดำ การสร้างเปลือกใหม่ ตายนิ่งหาย

